



Service de cardiologie pédiatrique Division of Pediatric Cardiology

Chers parents, votre enfant vient d'avoir un cathétérisme cardiaque et est prêt à rentrer à la maison. Voici les informations post-opératoires pour un rétablissement en toute sécurité.

Chef de service Division Head

A. Dancea, MD, MBA, FRCPC

Cardiologues Cardiologists

V. Beauséjour-Ladouceur
T. Cavallé-Garrido, MD, FRCPC
L. Jutras, MD, CM, FRCPC
W. Mawad, MD, FRCPC
C. Renaud, MD, FRCPC

H-KAP Enseignant H-KAP Teacher

M.J. Béland, MD, CM, FRCPC

Infirmières Nurses

M.-J. Guy, RN, MSc(A)
M. Zegray, RN, MSc(A)

Administration

A.M. Mormina

1001, boul. Décarie
Montréal QC H4A 3J1
Canada

Réception
514 412-4423

Cardiology Fax
514 412-4273

ECG Fax
514 412-4391

cusc.ca
muhc.ca

Soins au site chirurgical.

- Gardez le site de ponction sec et propre. Si le pansement est souillé, retirez-le et lavez la peau à l'eau et au savon. Laissez sécher le site à l'air libre et appliquez un autre pansement adhésif. Continuez à le changer, lorsque nécessaire, pendant 24 heures.
- Le site peut être un peu sensible pour quelques jours suivant l'intervention, mais ne doit pas être douloureux, enflé ou rouge.
- Vous observerez peut-être une ecchymose (décoloration bleutée) au site de ponction, causée par un hématome (petite quantité de sang sous la peau). Cette ecchymose n'est pas dangereuse et disparaîtra.

Gestion de la douleur

- Votre enfant pourrait être inconfortable ou avoir une légère fièvre le soir de l'intervention: de l'acétaminophène (Tylenol®, Tempra®) peut être administré.

Retour à la normale

- Activité : Le jour de l'intervention, votre enfant doit rester au lit sauf pour se rendre aux toilettes. Le lendemain, seules les activités calmes autour de la maison peuvent être pratiquées. Après 48 heures, votre enfant peut reprendre toutes ses activités, y compris le sport. Éviter de soulever des charges lourdes pendant une semaine.
- Bain : Un bain ou une douche est permis 24 heures après l'intervention.
- Alimentation : Commencez par des liquides clairs et si c'est bien toléré, progressez lentement vers un régime alimentaire normal. Votre enfant peut ressentir des nausées ou des vomissements pendant quelques heures après l'intervention. Si tel est le cas, offrez uniquement des liquides clairs jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.
- École/garderie : Votre enfant peut retourner après la procédure.

Quand s'inquiéter?

- Dans les 48 heures suivant le cathétérisme, consultez le cardiologue de garde si votre enfant présente l'un de ces symptômes : difficulté à se réveiller, perte de conscience, pâleur et faiblesse, vomissements persistants, rougeur au site de ponction, fièvre et douleur persistante.
- En cas de saignement au site de ponction, appliquez une pression sur le site avec deux doigts pendant au moins 10 minutes, si le saignement persiste, appelez-le « 911 » pour un transport immédiat aux urgences.

Coordonnées

Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Infirmières en cardiologie

514-412-4400 ext. 23269

Pour contacter le cardiologue de garde

514-412-4400 ext. 53333

Demander le cardiologue pédiatrique de garde

Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans cette brochure sont destinées à des fins éducatives. Il n'est pas destiné à remplacer les conseils ou les instructions d'un professionnel de la santé, ni à se substituer aux soins médicaux. Contactez un professionnel de la santé qualifié si vous avez des questions concernant vos soins.